

新型コロナウイルス対策の必要濃度

松井化学株式会社

ドライソープ

MC-セレクションB	ベースタンクに残っている溶剂量に対して「バクタック-Dホワイト（石油系）」を100リットルに対して80cc追加添加してください
W・クリーンCA-SP	
MC-PT（パーク用）	そのままの使用で構いません
他社製ドライソープ（抗菌剤未配合）	ベースタンクに残っている溶剂量に対して「バクタック-Dホワイト（石油系）」を100リットルに対して150cc追加添加してください

ドライ用抗菌剤

バクタック-Dホワイト（石油系）	100リットルに対して100cc濃度、5分間漬け込む
------------------	----------------------------

水用抗菌剤

バクタック-Lホワイト（水系）	0.1%（10リットルに対し10cc）濃度、5分間漬け込む
-----------------	-------------------------------

ソフター

MC-マロン	「バクタック-Lホワイト」（水系）を0.05%（10リットルに対し5cc）追加で添加し、5分間漬け込む
MC-ウエットソフト	

糊剤

ノリノリ	バクタック-Lホワイト（水系）を0.05%（10リットルに対し5cc）追加で添加してください
------	--

※注）スプレー加工の場合、品質にばらつきが生じ効果が不足する可能性があることが考えられますので、新型コロナウイルス対策として不十分であると考えられます。